

## INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA CON SUPREP SPLIT - DOSE

1. **Medicamento:** Por favor notifíquenos si usted toma los siguientes medicamentos: **Plavix, Aggrenox, Pletal (cilostazol), Coumadin (Warfarina), Pradaxa, Effient, Xarelto, Brilinta o Eliquis.** Estos medicamentos deben dejarse de tomar 5 días antes del procedimiento. Por favor, verifique con su cardiólogo o médico de atención primaria si puede dejar de tomar estos medicamentos debido a su condición médica. **Usted no debe usar Lovenox o Fragmin el día de su procedimiento.** Si usted toma una aspirina para bebés, puede continuar a menos que no lo recomiende su cardiólogo o médico de atención primaria. Si es diabético, consulte a su médico de atención primaria con respecto a su medicamento y dieta. **Usted puede continuar tomando todos los otros medicamentos.** Por favor llame a nuestra oficina con cualquier pregunta que pueda tener.

Si usted es Diabético o toma alguno de los siguientes medicamentos: Glucagon (GLP-1), Trulicity, Bydureon BCise, Byetta, Saxenda, Victoza, Adlyxin, Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Debe parar el medicamento una semana antes del procedimiento. Si consume Rybelsus pare su medicamento el día antes del procedimiento.

2. **Dieta Líquida:** El día antes de la colonoscopia, debe estar en una dieta líquida todo el día. **LÍQUIDOS CLAROS SÓLAMENTE! ¡NO COMA NADA SOLIDO!** Beba muchos líquidos durante todo el día.

### **Evite productos lactosos y todo lo que es Rojo, Azul o Morado!**

Jugos de frutas (sin Pulpa) Jugo de Manzana, Limonada	Paletas de Agua (No Rojo, Azul o Morado)
Café o Te (Sin Crema or Leche)	Caldo de pollo or res (Solo el conzome)
Gatorade	No productos lactosos o Alcohol
Agua	
Gelatina (No Rojo, Azul o Morado)	

### **3. Instrucciones de preparación:**

#### **DÍA ANTES:**

Prepare la primera dosis de SUPREP por la mañana vertiendo el contenido de UNA botella en la taza provista y llenándola hasta la línea de llenado con agua. Puede refrigerar.

Comenzará su primera dosis a las 4:00 PM Cuando termine, beba (2) tazas de 16 oz. tazas de agua. Este proceso debe realizarse en 2 horas. NO beba su preparación demasiado rápido o puede que le dé náuseas.

**SEGUNDA DOSIS:** A las 10:00 PM, beba la segunda dosis de la preparación. Siga nuevamente con (2) tazas 16 oz. de agua. Este proceso debe realizarse en 2 horas.

Asegúrese de beber líquidos claros entre las dosis de preparación para garantizar una hidratación adecuada.

#### **NO DEBE NADA 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.**

5. Por favor, quitarse todas sus joyas antes del procedimiento.

6. **Transporte:** Usted debe tener alguien que usted conoce le conduce a casa. Los taxis no son aceptables. Usted puede esperar estar en la instalación 2-3 horas desde el momento de su llegada.

#### **Por favor, presentese a:**

- North Central Surgical Center, 9301 N Central Expressway, Tower II, 6th floor, Suite 670,

Dallas, TX 75231 (214) 365-8380

- Baylor Ambulatory Endoscopy Center, 4708 Alliance Blvd., Medical Pavilion 1, Ste 210  
Plano, TX 75093 (469) 800-6021
- Baylor Scott & White Medical Center Plano, 4700 Alliance Blvd., 1st Floor, Registration  
Plano, TX 75093 (469) 814-5200

**Fecha:**

**Hora de procedimiento:**

**Hora de registracion:**

**Doctor:**

**PARA EVITAR UNA TARIFA POR NO PRESENTARSE / CANCELACIÓN, LLAME A LA OFICINA 48 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO AL (469) 800-6020.**